

Errata zu den Lösungen zum Buch: Theo de Jong: **Analysis**

Pearson 2012, ISBN 978-3-86894-112-8

Stand: 2. Juli 2013

Für Hinweise auf weitere Fehler bin ich sehr dankbar.

E-Mail: dejong@mathematik.uni-mainz.de

Seite, Zeile	falsch	richtig
12, 12 v.o.	2,,89	2,89
13, 1 v.o.	x_{-1}	x_{-i}
19, 4 v.o.	2^{10}	2^{-10}
19, 9 v.o.	$\lfloor \sqrt{2} \rfloor_2$	$\lfloor \sqrt{2} \rfloor_3$
19, 12 v.o.	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}^2$
40, 8 v.u.	$\cos(90^\circ)$	$\cos(90^\circ)$
40, 7 v.u.	$\cos(45^\circ \cos(30^\circ) - \sin(45^\circ \sin(30^\circ))$	$\cos(45^\circ) \cos(30^\circ) - \sin(45^\circ) \sin(30^\circ)$
53, 4 v.u.	als	also
55, 4 v.u.	$ \sin(x) < x$	$ \sin(x) \leq 1$
55, 3 v.u.	folgt wenn $a_n \neq 0$	folgt:
60, 2 v.o.	∞	$-\infty$
60, 5 v.o.	0	1/3
60, 6 v.o.	6. 0	6. 2 7. 0 8. 0

Aufgabe	falsch	richtig
60, 12 v.u	Geraden $x = 1$ und $x = -1$ sind senkrechte Asymptoten	Gerade $x = 1$ ist senkrechte Asymptote
62, 8 v.u.	$f(x) = y = \frac{4x-3}{5} \implies x = \frac{5y+3}{4}$. Also $f^{-1}(y) = \frac{5y+3}{4}$.	$f(x) = y = -3x + 7 \implies x = -\frac{y-7}{3}$. Also $f^{-1}(y) = -\frac{y-7}{3}$.
73, 6.v.u. (2x)	$f'(x) \cdot g(x)$	$f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$
83, 4.26, 1	$\operatorname{arsinh}(x) \quad \operatorname{arcosh}(x)$	$\sinh(x) \quad \cosh(x)$
141, 2 v.o.	$x^i b^j$	$x^i x^j$
141, 5 v.o.	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{(1-x)^2}$
142, 5.30,10.	a	a , wenn $a > 1$ und 1, wenn $a \leq 1$
142, 5.30,11.	2	1
144, 5.21, 5	-1/2	0
156, 6.1 1	$4 - 3i$	$4 + 3i$
156, 6.2, 3 (2x)	$\frac{a}{a^2 + b^2} a$	$\frac{a}{a^2 + b^2}$
173, 7 v.o	$6 \log(\operatorname{sqr}tx - 1)$	$6 \log(\operatorname{sqr}tx - 1)$
173, 8 v.o.	$2(t+1)\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{t}}{2(t+1)}$