

Errata zum Buch “Lineare Algebra”, 2. Auflage.
Errata zu den Lösungen ab Seite 3.

Stand: 23. September 2020

Seite	Zeile	Falsch	Richtig
172	10 v.u.	Matrizen	$n \times n$ -Matrizen
184	14 v.o.	gegeben, so	gegeben ist, nach evtl. Ergänzung mit anderen b_i aus $\text{Ker}(A^k)$, $(b_1, \dots, b_s)$ eine Basis modulo $\text{Ker}(A^{k-1})$. Es
186	9 v.o.	$(A - \lambda_i)^{m_1}$	$(A - \lambda_1 \cdot \text{Id})^{m_1}$
186	9 v.o.	$(A - \lambda_s)^{m_s}$	$(A - \lambda_s \cdot \text{Id})^{m_s}$
186	10 v.o.	$B_i := (A - \lambda_i)^{n_i}$	$B_i := A - \lambda_i \cdot \text{Id}$
186	10 v.o.	$(A - \lambda_i)^{m_i}$	$(A - \lambda_i \cdot \text{Id})^{m_i}$
200	8 v.u.	c_{ik}	(c_{ik})
201	1.v.o.	Zeigen Sie: Sei V ein	Sei V ein endlich dimensionaler
208	10 v.o.	Sei	Nach Normierung gilt $\ b_1\ = 1$. Sei
209	8 v.u.	$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^4$
209	5 v.u.	$(2, 1, 0, -2)$	$(2, 4, -1, 2)$
210	9 v.u.	$x^T \cdot A \cdot y$	$x^T \cdot A \cdot \bar{y}$
242	10 v.u.	$N \triangleleft G: \bigcap_{R \subset N}$	$N \triangleleft F(A): \bigcap_{R \subset N}$
248	9 v.o.	4.	4. Sei P eine p -Sylowgruppe von G .
250	7 v.o.	b^i , also $ba = a^i b$	b^i
263	8 v.o.	modulo l	modulo I
274	8 v.u.	$y^6 y^5$	$y^6 + y^5$
276	5 v.o.	$a_s f$	$a_s f_s$
276	6 v.u.	t	s
276	11 v.u.	j teilt $\text{LM}(f_j)$, nicht $\text{LM}(f_i)$	$j \neq i$ teilt $\text{LM}(f_j)$ kein Monom von f_i .
278	13,14 v.u.	$m(f_i, f_j)$	$m(f_j, f_i)$
284	10 v.o.	Letzter Satz fehlt.	Dann hat $M_g(t)$ die verschiedene Nullstellen $g(p_i)$ für $i = 1, \dots, s$, deshalb gilt $\deg(M_g(t)) = s$.
284	12 v.o.	$K[x_1, \dots, x_n]$	$K[t]$
288	14 v.o.	$a_1 g_1 + \dots + a_t g_t$	$a_1 f_1 + \dots + a_s f_s$
290	7 v.u.	$f \in$	$g \in$

306	17 v.u.	$(cg)^*$	$(c\bar{g})^*$
307	6 v.o.	Warum ist	Ist
330	9 v.u.	Beweis von $1 \notin I_f$ fehlt.	Siehe Ende der Errataliste.
304	6 v.o.	Elementen.	Elementen und schreibe $K = \mathbb{F}_p$.
305	18 v.o.	ist.	ist?
310	3 v. o.	9.7	9.6
310	17 v.u.	f und m^2	$f \cdot m + m^2$
310	16 v.u.	$r_s f_s$	r_s
310	15 v.u.	mod f .	mod $f \cdot m + m^2$
310	10 v.u.	a_i	t_i

Im Beweis von Satz 10.5 Nr 3 einfügen nach 8 v.u. "eindimensional":

Wir zeigen, dass $1 \notin I_f$. Sei $f_1(x) = f(x)$ und wir definieren rekursiv $f_{i+1}(x)$ durch

$$f_i(x) = (x - x_i)f_{i+1}(x) + f_i(x_i)$$

für $i = 2, \dots, n$. Hier ist $f_{i+1}(x) \in K[x_1, \dots, x_i][x]$ normiert vom Grad $n - i + 1$ in x . Insbesondere ist $f_{n+1} = 1$. Bez. $>_{lex}$ mit $x_1 < \dots < x_n$ gilt $LM(f_i(x_i)) = x_i^{n-i+1}$. Nach dem Produkt-Kriterium ist $(f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n))$ eine Gröbner Basis und $1 \notin \langle f_1(x_1), \dots, f_n(x_n) \rangle$. Weil

$$f(x) = (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n) \bmod \langle f_1(x_1), \dots, f_n(x_n) \rangle$$

folgt, dass $I_f \subset \langle f_1(x_1), \dots, f_n(x_n) \rangle \neq K[x_1, \dots, x_n]$ und $1 \notin I_f$.

Errata zu den Lösungen

Aufgabe 2.23 Nr. 4:

$$\begin{aligned}\det(a_1, a_2, a_3) &= 26 \\ \det(b, a_2, a_3) &= -92 \\ \det(a_1, b, a_3) &= -208 \\ \det(a_1, a_2, b) &= -122\end{aligned}$$

Also ist $(x_1, x_2, x_3) = (-46/13, -8, -61/13)$.

Aufgabe 7.50, Nr. 4:

Der gesuchte Vektor ist der bis auf einem Skalar eindeutig bestimmte Vektor, der in $W^\perp = \langle (0, 2, 2, 1), (-2, -2, 3, -1) \rangle$ liegt und senkrecht auf dem Eigenvektor zu -1 , d.h. $(2, 1, 0, -2)$ steht. Offenbar ist $(0, 2, 2, 1)$ selbst eine Lösung.