

Errata zum Buch “Analysis”, 2. Auflage.
 Errata zu den Lösungen ab Seite 4.

Stand December 5, 2025

Seite	Zeile	Falsch	Richtig
27	10 v.o.	$k(2) < k(2)$	$k(2) < k(3)$
28	12 v.u.	$a + c \leq a + c$	$a + c \leq b + c$
30	10 v.u.	Analog zeigt man, dass $c < a_n + b_n$ für fast alle n	
34	5 und 6 v.o	10^{-n-1}	10^{-n}
66	16 v.o.	Flächeinhalt	Flächeninhalt
71	14 v.u.	$\in (a, b) :$	$\in \mathbb{R}^2 : x \in (a, b)$ und
72	13 v.o.	U_k	$U^{(k)}$
72	8 v.u.	$\{\lambda x, \mu y) : (x, y) \in U$	$\{(\lambda x, \mu y) : (x, y) \in U\}$
72	8 v.u.	$ \lambda\mu \mu(V)$	$ \lambda\mu \mu(U)$
74	2 v.o.	$([b_1])_k$	$4^k([b_1])_k$
74		Beweis von 3.5 ersetzen.	Siehe Ende der Errataliste.
76	9 v.o.	Für	Einfachheitshalber sei $\mu(U \cup V) < \infty$. Für
81	7 v.o.	$w[2]$	$w[0]$
89	8 v.u.	$(\frac{p}{3})^2$	$(\frac{p}{3})^3$
108	9 v.u.	$x \in$	$\xi \in$
112	2 v.u.	ungerade	gerade
130	12 v.u.	$-x^2 + x - 2$	$-x^2 + x + 2$
134	10 v.o.	$[a, b)$	$[a, b) \rightarrow \mathbb{R}$
134	13 v.o.	$t - 1/k$	$b - 1/k$
136	1 v.u.	$x = t^2$	$t = x^2$
137	1 und 8 v.u.	$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$	$\int_a^b f(x) dx$
138	9 v.o.	$-\frac{1}{12}f''(\xi)$	$-\frac{1}{12}f''(\xi) \cdot (b - a)^3$
164	4 v.o.	$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$	$(a_n x^n)$
166	5 v.u.	$ x < 1$	$0 < x < 1$
182	1.v.u.	$g(x) = \sum a_n b^n $	$g_n(x) = a_n x^n$ und $f_n(x) = a_n b^n $
187	9 v.u.	$d_3 + d_1$	$d_3 - d_1$
187	8 v.u.	$d_3 - d_0$	$d_3 - d_1$
198	11 v.u.	$a \in U.$	$f(a) \in U.$

Seite	Zeile	Falsch	Richtig
208	7 v.u	$f(t, x)$	$f(x, t)$
224	12 v.u.	$R_n(x)$	$R_m(x)$
228	9 v.o.	fa	$f(a)$
242	8 v.u.	$a + \xi(x - a)$	$(a + \xi(x - a), b + \xi(g(x) - b))$
242	7 v.u.	$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \frac{-1}{D_y F(p)} D_x F(p)$	$g(x) = g(a) + \frac{-1}{D_y F(p)} D_x F(p) \cdot (x - a)$
242	6 v.u.	$D_x F(a)$	$D_x F(a, b)$
242	6 v.u.	$D_y F(a)$	$D_y F(a, b)$
244	15 v.o.	$V' \subset \mathbb{R}^{n+1}$	$V' \times I \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$
244	16 v.o.	$V' \rightarrow$	$V' \times I \rightarrow$
244	16 v.o	$.V' \times W$	$V' \times W \times I$
244	17 v.o.	$1, \dots, m$	$1, \dots, m$
248	17 v.o.	$\left(\begin{array}{c c} \text{Id} & D_x g(x) \end{array} \right)$	$\left(\begin{array}{c} \text{Id} \\ \hline g'(x) \end{array} \right)$
260	18 v.o.	$\lambda_n a_n$	$\lambda_n a_n)$
260	5 v.u.	$(f(a) - \varepsilon, f(a) - \varepsilon)$	$(f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon)$
264	1 v.u.	$\mu_n(U)$	$\mu_{n+p}(U)$
269	6. v.u	\int	\int_D
270	7 v.u.	$x^3 y + y^3$	$x^3 y + y^3 x$
278	5 v.o.	$\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_k(t)$	$D_1 \varphi(t), \dots, D_k \varphi(t)$
291	4 und 5 v.u.	(k, ∞)	$(\mathbb{R}^n \times (k, \infty))$
205	9 v.u.	f_n	f_k
296	5 v.o.	$\sum_{i=1}^n$	$\sum_{i=1}^s$
311	6 v.o	$x_0(t, \xi)$	$x_1(t, \xi)$
316	9 v.o.	e^a	e^{at}
318	4.v.u	$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x'(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$
326	3 v.u.	$t - b$	$b - t_0$
338	7 v.o.	\mathbb{R}^n	\mathbb{R}
349	4 v.o. und 8 v.u.	$I \cup \mathbb{P}$	I
349	10 v.o.	$(z - p_3)^2$	$(z - p_3)^2$
352	4 v.o	A	\overline{A}
361	Im Bild	f_0	$\nabla f_1(p)$
361	Im Bild	f_1	$\nabla f_0(p)$
361	Im Bild	dM	∂M

Beweis von 3.5

Angenommen die Aussage ist falsch. Für jedes $\ell \geq k$ existiert ein $Q_\ell \in U^{(\ell)}$ mit $Q_\ell \not\subset U_i$ für jedes $i \in I$. Sei $Q_\ell = [a_\ell, a_\ell + 2^{-\ell}] \times [b_\ell, b_\ell + 2^{-\ell}]$. Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß hat (a_ℓ) eine konvergente Teilfolge $(a_{\ell(j)})$ mit Grenzwert a und wiederum nach Bolzano-Weierstraß hat $(b_{\ell(j)})$ eine konvergente Teilfolge $(b_{\ell(j(i))})$ mit Grenzwert b . Sei $p = (a, b)$. Weil $p \in Q \subset \cup_{i \in I} U_i$, gibt es ein $i \in I$ mit $p \in U_i$. U_i ist eine offene Menge, deshalb gibt es ein offenes Rechteck $R = (c_1, c_2) \times (d_1, d_2)$ mit $p \in R \subset U_i$. Weil $(a_{\ell(j(i))})$ und $(b_{\ell(j(i))})$ gegen a bzw. b konvergieren, gibt es ein $N = \ell(j(i))$ mit $c_1 < a_N < a_N + 2^{-N} < c_2$ und $d_1 < b_N < b_N + 2^{-N} < d_2$. Aber dann ist $Q_N \subset R \subset U_i$, Widerspruch zur Wahl von Q_N !

Aufgabe 4.7. Die letzte Zeile ersetzen durch

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \left(\frac{1}{g(x)}\right)' = f'(x) \frac{1}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Aufgabe 4.30, 3. Teil.

Es reicht zu zeigen, dass $\ln(1 - x/t)^t = t \ln(1 - x/t) = h(t)$ eine wachsende Funktion von t ist.

$$h'(t) = \ln(1 - x/t) + \frac{t}{1 - x/t} \cdot \frac{x}{t^2} = -\ln\left(\frac{t}{x - t}\right) + \frac{x}{t - x}.$$

Es gilt $\ln(y) - y + 1 > 0$ (Das Maximum ist gleich 0 für $y = 1$). Somit ist $h'(t) > 0$ und h ist wachsend.

Aufgabe 6.40, 3. Teil. Ersetzte $(1 - x^2)^{1/2}$ durch $(1 - x^2)^{-1/2}$.

Aufgabe 6.23, Nr. 1 Ersetze $\frac{(1+1/n)^n}{=}$ durch $\frac{1}{(1+1/n)^n} =$

Aufgabe 11.19, nr. 2. Richtige Berechnung des Integrals:

$$\int_U u^2 v e^{v^2} d(u, v) = \left(\frac{u^3}{3} \right)_0^2 \cdot \frac{1}{2} \left(e^{v^2} \right)_0^2 = \frac{4}{3} (e^4 - 1).$$